


Baccalauréat ES Polynésie

13 septembre 2012

EXERCICE 1

4 points

Commun à tous les candidats

Le tableau ci-dessous représente l'évolution de l'indice du PIB de la Chine de 1985 à 2005, base 100 en 1985

année	1985	1988	1991	1994	1997	2000	2003	2005
Rang de l'année : $x_i, 1 \leq i \leq 8$	0	3	6	9	12	15	18	20
Indice du PIB : $y_i, 1 \leq i \leq 8$	100	131,29	172,38	226,32	297,15	390,13	512,22	614,16

Source : Banque Mondiale

On veut étudier l'évolution de l'indice du PIB y en fonction du rang de l'année x .

1. **a.** Représenter le nuage de points $(x_i ; y_i)$ ($1 \leq i \leq 8$) associé à cette série dans le plan muni d'un repère orthogonal d'unités graphiques :
sur l'axe des abscisses : 1 cm pour 1 année ;
sur l'axe des ordonnées : 1 cm pour 50.
- b.** Un ajustement affine semble-t-il approprié ?
2. Pour $1 \leq i \leq 8$, on pose $z_i = \ln y_i$. Recopier et compléter le tableau suivant (les valeurs de z_i seront arrondies au centième).

Rang de l'année : $x_i, 1 \leq i \leq 8$	0	3	6	9	12	15	18	20
$z_i = \ln y_i, 1 \leq i \leq 8$								

3. Déterminer à l'aide de la calculatrice une équation de la droite d'ajustement de z en x obtenue par la méthode des moindres carrés (les coefficients seront arrondis au centième). Aucune justification n'est demandée.
4. En déduire une estimation de l'indice du PIB de la Chine en 2012 d'après cet ajustement.
5. Dans le cas général donner un ajustement exponentiel de y en fonction de x , sous la forme $y = ae^{bx}$, les coefficients a et b étant arrondis au centième.

EXERCICE 2

5 points

Pour les candidats n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité

Les parties A et B de cet exercice sont indépendantes

PARTIE A

Le tableau ci-dessous donne la récolte de bois en France en 2005 en milliers de m^3 suivant que l'on a affaire à des feuillus ou des conifères destinés au bois d'œuvre ou au bois d'industrie.

	Feuillus	Conifères	Total
Bois d'œuvre	6 076	14 803	20 879
Bois d'industrie	5 413	6 805	12 218
Total	11 489	21 608	33 097

Source : Ministère de l'Agriculture et de la Pêche - SCEES 2005

Dans cette partie, les pourcentages seront arrondis à 1 %.

À l'aide du tableau ci-dessus :

1. Déterminer le pourcentage de feuillus dans la récolte totale.
2. Déterminer, parmi les conifères, le pourcentage de bois destiné à l'industrie.

PARTIE B

Chez un grossiste, les quatre catégories « feuillu - bois d'œuvre », « feuillu - bois d'industrie », « conifère - bois d'œuvre » et « conifère - bois d'industrie » sont réparties chacune dans différents lots de même volume.

On sait par ailleurs que :

- 70 % des lots sont du bois de conifère ;
- Parmi les lots de feuillus, 45 % sont destinés à l'industrie ;

Le grossiste prélève au hasard un lot (on suppose que tous les lots ont la même chance d'être choisis).

On considère les événements :

- F : « le lot est constitué de feuillus »,
 C : « le lot est constitué de conifères »,
 I : « le lot est destiné à l'industrie ».

1. Traduire toutes les données de l'énoncé à l'aide d'un arbre pondéré (on ne demande aucune explication).

La probabilité qu'un lot pris au hasard soit destiné au bois d'œuvre est de 0,585.

2. Déterminer la probabilité de l'évènement $I \cap C$. Interpréter ce résultat.
3. Le lot pris au hasard est destiné à l'industrie. Quelle est la probabilité qu'il soit constitué de conifères ?
4. Quatre lots sont prélevés au hasard. Vue la grande quantité de lots présents chez le grossiste, on peut assimiler ce prélèvement à une succession de quatre tirages identiques et indépendants.
Déterminer la probabilité qu'il y ait au moins un lot constitué de bois d'œuvre.

EXERCICE 2

5 points

Pour les candidats ayant suivi l'enseignement de spécialité

Le centre commercial Commerce Plus est implanté dans une ville. La première semaine, 80 % des habitants de la ville viennent faire leurs achats dans ce centre commercial, puis on constate dans les semaines suivantes que :

- la probabilité qu'un habitant étant venu faire des achats dans le centre commercial y retourne la semaine suivante est égale à 0,55 ;
- la probabilité qu'un habitant n'étant pas venu faire des achats dans le centre commercial y aille la semaine suivante est égale à 0,6.

On cherche à étudier l'évolution de la répartition des visites des habitants dans le centre commercial sur plusieurs semaines.

1. On note A l'état : « l'habitant vient faire ses courses au centre commercial ».
On note B l'état : « l'habitant ne vient pas faire ses courses au centre commercial ».
 - a. Représenter la situation ci-dessus par un graphe probabiliste.
 - b. On note M la matrice de transition de ce graphe.

$$\text{Vérifier que } M = \begin{pmatrix} 0,55 & 0,45 \\ 0,6 & 0,4 \end{pmatrix}.$$

2. On appelle $P_n = (a_n \quad b_n)$ la matrice traduisant la répartition des habitants selon leur venue au centre commercial au cours de la n -ième semaine :

- a_n représente la proportion d'habitants qui vient faire ses courses au centre commercial au cours de la n -ième semaine,
- b_n représente la proportion d'habitants qui ne vient pas faire ses courses au centre commercial au cours de la n -ième semaine.

Ainsi, on a $P_1 = (0,8 \quad 0,2)$.

- a. Calculer P_2 et P_3 .
 - b. Donner une interprétation de P_3 en termes de répartition des habitants.
3. Soit $P = (x \quad y)$ la matrice ligne de l'état probabiliste stable.
- a. Déterminer x et y . On donnera les valeurs exactes, puis les résultats arrondis au centième.
 - b. Interpréter ces résultats.

EXERCICE 3

4 points

Commun à tous les candidats

Une entreprise fabrique un produit chimique. Elle peut en produire x mètres cube chaque jour ; on suppose que x appartient à l'intervalle $[1 ; 6]$.

Le coût total de production C_T , exprimé en milliers d'euros, est fonction de la quantité produite x :

$$C_T(x) = \frac{x^2}{2} + 4 \ln x + 5,6 \quad \text{pour } x \in [1 ; 6].$$

1. Vérifier que la fonction C_T est strictement croissante sur l'intervalle $[1 ; 6]$.
2. On note $C_M(x)$ le coût moyen de production en milliers d'euros du mètre cube pour une production journalière de x mètres cube, avec $x \in [1 ; 6]$.

On rappelle que $C_M(x) = \frac{C_T(x)}{x}$.

- a. Écrire l'expression de $C_M(x)$ en fonction de x .
- b. On admet que la fonction C_M est dérivable sur l'intervalle $[1 ; 6]$ et on appelle C'_M sa fonction dérivée.

Calculer $C'_M(x)$, et vérifier que $C'_M(x) = \frac{x^2 - 3,2 - 8 \ln x}{2x^2}$ pour tout x de l'intervalle $[1 ; 6]$.

3. Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[1 ; 6]$ par $f(x) = x^2 - 3,2 - 8 \ln x$.
 - a. On admet que f est dérivable sur $[1 ; 6]$. Étudier les variations de f sur $[1 ; 6]$.
 - b. Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ possède une solution unique α dans $[2 ; 6]$; déterminer une valeur approchée par excès à 10^{-1} près de α .
 - c. En déduire le signe de $f(x)$ sur $[1 ; 6]$ (on ne demande pas de justification).
4. On prendra pour α la valeur approchée trouvée à la question 3. b.
 - a. En utilisant les résultats de la question 3., étudier le sens de variation de la fonction C_M sur $[1 ; 6]$. Construire son tableau de variation (les valeurs dans le tableau seront arrondies au dixième).
 - b. Quel est le coût moyen minimal de production du mètre cube de produit ?
5. Dans cette question toute trace de recherche, même incomplète, ou d'initiative même non fructueuse, sera prise en compte dans l'évaluation.

Comment faut-il choisir le prix de vente du mètre cube de produit pour que l'entreprise puisse faire des bénéfices quelle que soit la production choisie dans l'intervalle donné ?

EXERCICE 4**7 points****Commun à tous les candidats**

Soit f une fonction définie et dérivable sur l'ensemble des réels \mathbb{R} . On note f' sa fonction dérivée sur \mathbb{R} .

On appelle \mathcal{C}_f sa courbe représentative, représentée en ANNEXE 1 dans un repère orthonormé. On appelle (T) la tangente à \mathcal{C}_f au point A de coordonnées $(0 ; -1)$.

On admet que la fonction f admet un maximum en $x = 3$.

Partie A

Cette partie est un QCM (Questionnaire à Choix Multiples). Chaque question admet une seule réponse exacte. Pour chacune des questions, indiquer sur votre copie le numéro de la question et recopier la réponse choisie. Il n'est pas demandé de justification.

Dans cette première partie, une réponse exacte rapporte 0,5 point ; une réponse fautive enlève 0,25 point ; l'absence de réponse ne rapporte ni n'enlève aucun point. Si le total des points est négatif, la note attribuée à cette partie est ramenée à zéro.

Question 1 :

- $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

Question 2 : sur l'intervalle $[-1 ; 7]$ $f'(x)$ vérifie :

- $f'(x) > 0$ sur $]1 ; 7]$
- $f'(x) < 0$ sur $[-1 ; 0]$
- $f'(x) < 0$ sur $]3 ; 7]$

Question 3 : l'équation réduite de la tangente à la courbe \mathcal{C}_f au point A est :

- $y = -1$
- $y = x + 1$
- $y = 1,5x - 1$

Question 4 :

- $\int_2^4 f(x) dx = f(4) - f(2)$
- $0,5 \leq \int_2^4 f(x) dx \leq 1,5$
- $\int_2^4 f(x) dx$ n'existe pas.

Partie B

On considère la fonction g définie et dérivable sur l'ensemble des réels \mathbb{R} , telle que

$$g(x) = (-2x - 2) \times e^{-0,5x}$$

On note g' sa fonction dérivée sur \mathbb{R} .

1. Démontrer que pour tout x appartenant à \mathbb{R} , $g'(x) = (x - 1) \times e^{-0,5x}$.
2. Étudier le signe de g' sur \mathbb{R} et en déduire les variations de g sur \mathbb{R} .
3. Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$. (On utilisera le résultat suivant : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-0,5x} = 0$).
4. Construire la courbe représentative de g , notée \mathcal{C}_g , dans le repère fourni en ANNEXE 1 (sur lequel est construite \mathcal{C}_f).
5. Donner graphiquement un encadrement par deux entiers consécutifs des coordonnées de I , point d'intersection des courbes \mathcal{C}_f et \mathcal{C}_g .
6. On admet maintenant que $g' = f$.
Déterminer par le calcul les coordonnées exactes du point I .
7. Calculer la valeur moyenne de f sur $[0 ; 1]$; on donnera d'abord sa valeur exacte puis sa valeur approchée à 10^{-2} près.

ANNEXE 1

À rendre avec la copie

Exercice 4

