

Durée : 4 heures

∞ Corrigé du baccalauréat S Amérique du Sud ∞
8 novembre 2019

EXERCICE 1

6 points

Commun à tous les candidats

Les parties A, B et C peuvent être traitées de façon indépendante.
Dans tout l'exercice, les résultats seront arrondis à 10^{-3} .

Partie A :

1. L'espérance (ici la durée de vie moyenne) est égale à l'inverse du paramètre :

$$E(T) = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{0,0555} \approx 18,02 \approx 18 \text{ (mois)}.$$

2. La probabilité que la durée de vie du chronomètre soit comprise entre 12 et 24 mois est égale à :


$$P(12 \leq T \leq 24) = e^{-\lambda \times 12} - e^{-\lambda \times 24} = e^{-0,0555 \times 12} - e^{-0,0555 \times 24} \approx 0,5138 - 0,2640 \approx 0,250.$$

La probabilité que la durée de vie du chronographe soit comprise entre 12 et 24 mois est égale à 0,25 à 10^{-3} près.

3. La probabilité que le chronomètre fonctionne 12 mois de plus est $e^{-0,0555 \times 12} \approx 0,5138$, soit 0,514 à 10^{-3} près.

Partie B :

1. a. On peut dresser un arbre pondéré de probabilités :



La probabilité que le roulement provienne du fournisseur A et soit défectueux est égale à :

$$P(A \cap D) = P(A) \times P_A(D) = 0,4 \times 0,03 = 0,012.$$

- b. On calcule de même la probabilité que le roulement provienne du fournisseur B et soit défectueux :

$$P(B \cap D) = P(B) \times P_B(D) = 0,6 \times 0,05 = 0,030.$$


D'après la loi des probabilités totales, on a :

$$P(D) = P(A \cap D) + P(B \cap D) = 0,012 + 0,030 = 0,042.$$

Donc la probabilité que le roulement défectueux provienne du fournisseur B est égale à :

$$P_D(B) = \frac{P(D \cap B)}{P(D)} = \frac{0,030}{0,042} = \frac{30}{42} = \frac{5}{7} \approx 0,7142, \text{ soit } 0,714 \text{ à } 10^{-3} \text{ près.}$$

2. Soit x ($0 \leq x \leq 1$) la proportion de roulements commandés au fournisseur A; l'arbre de probabilités devient :



La probabilité d'avoir un roulement défectueux est alors égale à :

$p(D) = P(A \cap D) + P(B \cap D) = 0,03x + 0,05(1-x) = 0,03x + 0,05 - 0,05x = 0,05 - 0,02x$. On veut que cette probabilité soit inférieure à 0,035, d'où l'inéquation :

$p(D) < 0,035 \iff 0,05 - 0,02x < 0,035 \iff 0,05 - 0,035 < 0,02x \iff 0,015 < 0,02x$, d'où en multipliant par 50 :

$0,75 < x$: il faut donc se fournir chez A à plus de 75 %.

Partie C :

1. Avec une moyenne de 8 mm et un écart type σ de 0,1, la probabilité qu'un roulement soit conforme est :

$P(7,8 \leq X \leq 8,2) = P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma)$: ce résultat est dans le cours : 0,95. On peut le retrouver à la calculatrice.

2. Le président a acheté $30 \times 16 = 480$ roulements.

On a donc $n = 480$ et une probabilité d'avoir un roulement défectueux de $p = 0,05$.

Comme $n > 30$, $np = 480 \times 0,05 = 24 > 5$ et $n(1-p) = 480 \times 0,95 = 46 > 5$, on peut chercher un intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95 % :

$$I = \left[p - 1,96\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} ; p + 1,96\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \right] \approx [0,0305 ; 0,0695].$$

Dans le contrôle on a trouvé 38 roulements non conformes sur 480, soit une proportion de $\frac{38}{480} \approx 0,079$.

Comme $0,079 \notin [0,0305 ; 0,0695]$, le président peut remettre en cause l'affirmation du fournisseur B.

3. a. La loi suivie par $X' = \frac{X-8}{\sigma}$ est une loi normale centrée réduite.

b. On a $7,8 \leq X \leq 8,2 \iff -0,2 \leq X-8 \leq 0,2 \iff \frac{-0,2}{\sigma} \leq \frac{X-8}{\sigma} \leq \frac{0,2}{\sigma}$.

On a donc $P\left(\frac{-0,2}{\sigma} \leq \frac{X-8}{\sigma} \leq \frac{0,2}{\sigma}\right) = 0,96$, soit par symétrie :

$$P\left(\frac{X-8}{\sigma} \leq \frac{0,2}{\sigma}\right) = 0,02.$$

La calculatrice donne $\sigma \approx 0,097$.

EXERCICE 2

5 points

Commun à tous les candidats

$$f(t) = 3te^{-\frac{1}{4}t} + 2 \text{ avec } t \geq 0,$$

où $f(t)$ représente le taux de vasopressine (en $\mu\text{g}/\text{mL}$) dans le sang en fonction du temps t (en minute) écoulé après le début d'une hémorragie.

1. a. On a $e^{-\frac{1}{4} \times 0} = 1$, donc $f(0) = 3 \times 0 \times 1 + 2 = 0 + 2 = 2$.

b. On a $12 \text{ s} = \frac{12}{60} = \frac{1}{5} = 0,2$ (min).

On calcule $f(0,2) = 3 \times 0,2e^{-\frac{1}{4} \times 0,2} + 2 = 0,6e^{-0,05} + 2 \approx 2 + 0,57 \approx 2,57$.

Ce taux est supérieur à 2,5, donc anormal.

c. On sait que $\lim_{t \rightarrow +\infty} -\frac{1}{4}t = -\infty$.

Avec $X = -\frac{1}{4}t$, on sait que $\lim_{t \rightarrow +\infty} -\frac{1}{4}t = -\infty \Rightarrow \lim_{t \rightarrow +\infty} X e^X =$, donc finalement :

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = 2.$$

Cela signifie qu'à terme le taux de vasopressine va se stabiliser à 2 $\mu\text{g/mL}$.

2. f somme et produit de fonctions dérivable sur $[0; +\infty[$ est dérivable sur cet intervalle et

$$f'(t) = 3e^{-\frac{1}{4}t} + 3t \times \left(-\frac{1}{4}\right)e^{-\frac{1}{4}t} = e^{-\frac{1}{4}t} \left(3 - \frac{3}{4}t\right) = 3e^{-\frac{1}{4}t} \left(1 - \frac{1}{4}t\right) = \frac{3}{4}(4-t)e^{-\frac{1}{4}t}.$$

3. a. On sait que quel que soit le réel t , $e^{-\frac{1}{4}t} > 0$; le signe de $f'(t)$ est donc celui de $4-t$:

- $4-t \iff 4 > t$;
- $4-t \iff 4 < t$;
- $4-t = 0 \iff 4 = t$.

Conclusion : la fonction f est

- croissante sur $[0; 4]$ de $f(0) = 2$ à $f(4) = 3 \times 4e^{-\frac{1}{4} \times 4} + 2 = 2 + 12e^{-1} \approx 6,41$;
- décroissante sur $[4; +\infty[$ de $f(4) \approx 6,41$ à $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = 2$.

b. La fonction étant croissante sur $[0; 4]$ de $f(0) = 2$ à $f(4) \approx 6,41$ puis décroissante sur $[4; +\infty[$, $f(4) = 2 + 12e^{-1} \approx 6,41$ est le maximum de la fonction sur $[0; +\infty[$.

4. a. Sur l'intervalle $[0; 4]$, la fonction f est continue car dérivable et strictement croissante de $f(0) = 2$ à $f(4) \approx 6,41$: d'après le théorème des valeurs intermédiaires il existe un réel unique $t_0 \in [0; 4]$, tel que $f(t_0) = 2,5$.

La calculatrice donne :

$$f(0) = 2 \text{ et } f(1) \approx 4,33, \text{ donc } 0 < t_0 < 1;$$

$$f(0,1) \approx 2,29 \text{ et } f(0,2) \approx 2,57, \text{ donc } 0,1 < t_0 < 0,2;$$

$$f(0,17) \approx 2,49 \text{ et } f(0,18) \approx 2,52, \text{ donc } 0,17 < t_0 < 0,18;$$

$$f(0,174) \approx 2,499 \text{ et } f(0,175) \approx 2,503, \text{ donc } 0,174 < t_0 < 0,175.$$

On admet qu'il existe une unique valeur t_1 appartenant à $[4; +\infty[$ vérifiant $f(t_1) = 2,5$.

On donne une valeur approchée de t_1 à 10^{-3} près : $t_1 \approx 18,930$.

b. Sur l'intervalle $[t_0; 4]$, la fonction f est croissante, donc sur cet intervalle $f(t) \geq f(t_0) = 2,5$ et sur l'intervalle $[4; t_1]$ la fonction est décroissante donc sur cet intervalle $f(t) \geq f(t_1) = 2,5$.

On a donc $f(t) > 2,5$ sur l'intervalle $]t_0; t_1[$ ce qui signifie que le taux de vasopressine sera anormal pendant $t_1 - t_0 \approx 18,93 - 0,175$ soit environ 18,755 min soit 18 min 45 s.

5. Soit F la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $F(t) = -12(t+4)e^{-\frac{1}{4}t} + 2t$.

a. La fonction F somme de deux fonctions dérivable sur $[0; +\infty[$ est dérivable sur cet intervalle et

$$F'(t) = -12e^{-\frac{1}{4}t} - 12(t+4) \times \left(-\frac{1}{4}\right)e^{-\frac{1}{4}t} + 2 = -12e^{-\frac{1}{4}t} + 3te^{-\frac{1}{4}t} + 12e^{-\frac{1}{4}t} + 2 = 3te^{-\frac{1}{4}t} + 2 = f(t). \text{ Donc } F \text{ est une primitive de } f \text{ sur } [0; +\infty[.$$

b. Le taux moyen est égal à :

$$v_m = \frac{1}{t_1 - t_0} \int_{t_0}^{t_1} f(t) dt = \frac{1}{t_1 - t_0} [F(t)]_{t_0}^{t_1} = \frac{1}{t_1 - t_0} [F(t_1) - F(t_0)] = \frac{1}{t_1 - t_0} \left(-12(t_1+4)e^{-\frac{1}{4}t_1} + 2t_1 - \left[-12(t_0+4)e^{-\frac{1}{4}t_0} + 2t_0 \right] \right) \approx 4,43, \text{ soit en moyenne } 4,4 \mu\text{g/mL}.$$

EXERCICE 3

4 points

Commun à tous les candidats

Partie A :

1. M et N appartiennent à deux droites parallèles de la face FBCG; les droites (FB) et (GN) sont coplanaires.

BCGF étant un carré on a donc $\overrightarrow{FB} = \overrightarrow{GC}$.

Or M étant le milieu de [FB], on a $\overrightarrow{MB} = \frac{1}{2}\overrightarrow{FB}$ et comme $\overrightarrow{CN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{GC}$, on a donc $\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{CN} \iff$ MBNC est un parallélogramme dont les diagonales [BC] et [MN] ont le même milieu I.

2. Voir la section sur la figure.

M et I appartiennent au plan (PMN) et à la face (BCGF), donc [MI] est l'intersection de la face (BCGF) du cube avec le plan.

Dans cette face (BCGF) dans le triangle (BCF), on a (droite des milieux : $\overrightarrow{MI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{FC}$).

Or $\overrightarrow{FC} = \overrightarrow{ED}$, donc $\overrightarrow{MI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{ED}$, donc les droites (MI) et (ED) sont parallèles, mais P \in (ED), car P est le centre de la face (ADHE), donc la section du plan (PMN) avec la face (ADHE) est le segment [ED].

Il en résulte aisément les intersections avec la face (BAEF) : le segment [ME] et l'intersection avec la face (BCDA) : le segment [ID].

La section est donc le quadrilatère (MIDE).

Partie B :

1. Justifier que le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal au plan (MNP).

• Pour le repère choisi on a M $\left(1; 0; \frac{1}{2}\right)$, N $\left(1; 1; -\frac{1}{2}\right)$ et P $\left(0; \frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$. On en déduit les coordonnées des vecteurs :

$$\overrightarrow{MN} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{MP} \begin{pmatrix} -1 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Or } \vec{n} \cdot \overrightarrow{MN} = 0 + 2 - 2 = 0 \text{ et } \vec{n} \cdot \overrightarrow{MP} = -1 + 1 + 0 = 0.$$

Donc le vecteur \vec{n} orthogonal à deux vecteurs manifestement non colinéaires du plan MNP est un vecteur normal à ce plan.

On sait qu'alors :

$$M(x; y; z) \in (\text{MNP}) \iff 1x + 2y + 2z + d = 0.$$

En particulier on a :

$$P \in (\text{MNP}) \iff 1 \times 0 + 2 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{2} + d = 0 \iff 1 + 1 + d = 0 \iff d = -2.$$

$$\text{Conclusion : } M(x; y; z) \in (\text{MNP}) \iff x + 2y + 2z - 2 = 0.$$

2. On sait que \vec{n} est un vecteur normal au plan (MNP). Les équations paramétriques de la droite (d) passant par G et orthogonale au plan (MNP) s'obtiennent en traduisant l'égalité vectorielle :

Il existe $t \in \mathbb{R}$ tel que $\overrightarrow{GM} = t \vec{n}$, d'où avec G(1; 1; 1) :

$$\begin{cases} x-1 = 1t \\ y-1 = 2t \\ z-1 = 2t \end{cases} \iff \begin{cases} x = 1+t \\ y = 1+2t \\ z = 1+2t \end{cases}$$

3. Si M(x; y; z) appartient à la droite (d) et au plan (MN), ses coordonnées vérifient les équations paramétriques de la droite et l'équation cartésienne du plan, soit le système :

$$\begin{cases} x = 1+t \\ y = 1+2t \\ z = 1+2t \\ x+2y+2z-2 = 0 \end{cases} \Rightarrow 1+t+2(1+2t)+2(1+2t)-2=0 \iff 3+9t=0 \iff$$

$$9t = -3 \iff t = -\frac{1}{3}, \text{ d'où remplaçant dans les équations paramétriques :}$$

$$\begin{cases} x = 1 - \frac{1}{3} \\ y = 1 - \frac{2}{3} \\ z = 1 - \frac{2}{3} \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{2}{3} \\ y = \frac{1}{3} \\ z = \frac{1}{3} \end{cases}$$

On a donc K $\left(\frac{2}{3}; \frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right)$.

$$\text{On a } GK^2 = \left(1 - \frac{2}{3}\right)^2 + \left(1 - \frac{1}{3}\right)^2 + \left(1 - \frac{1}{3}\right)^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{9} + \frac{4}{9} + \frac{4}{9} = \frac{9}{9} = 1, \text{ d'où } GK = 1.$$

4. On a vu dans la partie A que la section du cube par le plan (PMN) est le quadrilatère MEDI, donc le plan (MEDI) est le plan (PMN).

Dans la pyramide GMEDI la droite (d) contient G (question 2.), est orthogonale au plan (MNP) ou (MEDI) (question 2. et coupe le plan (MNP) en K (question 3.). Donc [GK] est la hauteur de la pyramide dont le volume est :

$$V_{(\text{GMEDI})} : \frac{1}{3} \mathcal{A}(\text{AEDI}) \times \text{GK} = \frac{1}{3} \times \frac{9}{8} \times 1 = \frac{3}{8} \text{ unité de volume.}$$

EXERCICE 4

5 points

Candidats n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier $n \geq 0$ par :

$$\begin{cases} u_0 &= 5 \\ u_{n+1} &= 3 - \frac{10}{u_n + 4} \end{cases}$$

Partie A :

1. • Avec $n = 0$, $u_1 = 3 - \frac{10}{5+4} = 3 - \frac{10}{9} = \frac{27-10}{9} = \frac{17}{9}$;
 • Avec $n = 1$, $u_2 = 3 - \frac{10}{\frac{17}{9}+4} = 3 - \frac{10}{\frac{53}{9}} = 3 - \frac{90}{53} = \frac{159-90}{53} = \frac{69}{53}$.

2. Démonstration par récurrence ;

Initialisation : $u_0 = 5 \geq 1$: la propriété est vraie au rang zéro ;

Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$, tel que $u_n \geq 1$.

$$u_n \geq 1 \Rightarrow u_n + 4 \geq 5 \Rightarrow \frac{1}{5} \geq \frac{1}{u_n + 4} \Rightarrow \frac{10}{5} \geq \frac{10}{u_n + 4} \Rightarrow -\frac{10}{u_n + 4} \leq -2 \Leftrightarrow$$

$$3 - \frac{10}{u_n + 4} \geq 3 - 2, \text{ soit finalement } u_{n+1} \geq 1 : \text{ la propriété est héréditaire.}$$

La propriété est vraie au rang 0 et si elle est vraie à un rang n , elle est vraie au rang $n + 1$: d'après le principe de récurrence, pour tout entier naturel n , $u_n \geq 1$.

3. Soit $n \in \mathbb{N}$: $u_{n+1} - u_n = 3 - \frac{10}{u_n + 4} - u_n = 3 - u_n - \frac{10}{u_n + 4} = \frac{(3 - u_n)(u_n + 4) - 10}{u_n + 4} = \frac{-u_n^2 - u_n + 12 - 10}{u_n + 4} = \frac{-u_n^2 - u_n + 2}{u_n + 4}$.

Le trinôme a deux racines évidentes 1 et -2 ; il se factorise donc en :

$$-u_n^2 - u_n + 2 = (-u_n + 1)(u_n + 2) \text{ et finalement :}$$

$$u_{n+1} - u_n = \frac{(1 - u_n)(u_n + 2)}{u_n + 4} \text{ quel que soit } n \in \mathbb{N}.$$

4. On a démontré à la question 2. que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 1$, donc $u_n + 4 > 0$, $u_n + 2 > 0$ et $u_n \geq 1$ entraîne $1 - u_n < 0$ et donc finalement pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n < 0$, ce qui démontre que la suite (u_n) est décroissante.
5. La suite (u_n) est décroissante et minorée par 1 : elle converge donc vers une limite qui est supérieure ou égale à 1.

Partie B :

On considère la suite (v_n) définie pour tout entier naturel n par $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 2}$.

1. a. Pour tout naturel $n \in \mathbb{N}$, on a $v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 1}{u_{n+1} + 2} = \frac{3 - \frac{10}{u_n + 4} - 1}{3 - \frac{10}{u_n + 4} + 2} = \frac{2 - \frac{10}{u_n + 4}}{5 - \frac{10}{u_n + 4}} = \frac{\frac{2u_n + 8 - 10}{u_n + 4}}{\frac{5u_n + 20 - 10}{u_n + 4}} = \frac{2u_n - 2}{5u_n + 10} = \frac{2u_n - 2}{5u_n + 10} = \frac{2(u_n - 1)}{5(u_n + 2)} = \frac{2}{5} \frac{u_n - 1}{u_n + 2} = \frac{2}{5} v_n$.

L'égalité $v_{n+1} = \frac{2}{5}v_n$, vraie pour tout naturel n , démontre que la suite (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{2}{5} = \frac{4}{10} = 0,4$ et de premier terme $v_0 = \frac{u_0 - 1}{u_0 + 2} = \frac{4}{7}$.

b. On sait que pour tout naturel n , $v_n = v_0 \times 0,4^n = \frac{4}{7} \times 0,4^n$.

Comme $\frac{4}{7} < 1$ et $0,4 < 1$ et par conséquent $0,4^n < 1$, on peut en déduire que $v_n < 1$, donc en particulier $v_n \neq 1$.

2. On part de la définition :

$$v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 2} \iff v_n(u_n + 2) = u_n - 1 \iff v_n u_n + 2v_n = u_n - 1 \iff$$

$$v_n u_n - u_n = -2v_n - 1 \iff u_n(v_n - 1) = -2v_n - 1 \iff u_n = \frac{-2v_n - 1}{v_n - 1} \iff u_n = \frac{2v_n + 1}{1 - v_n}$$

car $v_n \neq 1$.

3. $v_n = \frac{4}{7} \times 0,4^n$. On sait comme $0 < 0,4 < 1$ que $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0,4^n = 0$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$.

On a donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2v_n + 1 = 1$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 - v_n = 1$ et finalement

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{1}{1} = 1.$$

Partie C :

On considère l'algorithme ci-contre.

- À la fin on a $n = 6$.
- La suite (u_n) est décroissante et tend vers 1 : on a $u_5 \approx 1,017$; la valeur suivante est inférieure à 1,01 : $u_6 \approx 1,008$.

$u \leftarrow 5$
 $n \leftarrow 0$
 Tant que $u \geq 1,01$
 $n \leftarrow n + 1$
 $u \leftarrow 3 - \frac{10}{u + 4}$
 Fin du Tant que

EXERCICE 4

5 points

Candidats ayant suivi l'enseignement de spécialité

Partie A :

Soient a et b deux entiers naturels tels que $a > b$.

- Tout diviseur commun de a et de b est un diviseur commun de $a - b$ et de b ;
 - Tout diviseur commun de $a - b$ et de b est un diviseur commun de $(a - b) + b = a$

Les diviseurs communs de a et b sont donc les diviseurs communs de $a - b$ et de b , donc leur plus grand diviseur est le même.
- On a donc d'après le résultat précédent :
 $\text{PGCD}(4^3 - 1, 4^2 - 1) = \text{PGCD}(4^3 - 1 - 4^2 + 1; 4^2 - 1) = \text{PGCD}(4^3 - 4^2; 4^2 - 1) = \text{PGCD}(48; 15) = \text{PGCD}(33; 15) = \text{PGCD}(18; 15) = \text{PGCD}(3; 15) = 3$.
-

Partie B :

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0, u_1 = 1$ et pour tout entier naturel n par :

$$u_{n+2} = 5u_{n+1} - 4u_n.$$

On admettra que pour tout entier naturel n non nul, u_n est un entier naturel non nul.

$$1. \text{ On a } V_{n+1} = \begin{pmatrix} u_{n+2} \\ u_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5u_{n+1} - 4u_n \\ u_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5u_{n+1} - 4u_n \\ u_{n+1} + 0u_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -4 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{n+1} \\ u_n \end{pmatrix} = AV_n,$$

$$\text{avec } A = \begin{pmatrix} 5 & -4 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. On pose $P = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

a. On a $\det(P) = 1 \times -1 \times 4 = -3 \neq 0$, donc P est inversible.

Soit $P^{-1} = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}$.

On sait que $P \times P^{-1} = I_2 = P^{-1} \times P$. Donc les nombres x, y, z et t vérifient le système :

$$\begin{cases} x + 4z = 1 \\ y + 4t = 0 \\ x + z = 0 \\ y + t = 1 \end{cases}$$

Par différence des équations 1 et 3, on obtient $3z = 1 \iff z = \frac{1}{3}$.

Par différence des équations 2 et 4, on obtient $3t = -1 \iff t = -\frac{1}{3}$.

D'où $x = -\frac{1}{3}$ et $y = -\frac{4}{3}$.

On a donc $x = -\frac{1}{3}, y = -\frac{4}{3}, z = \frac{1}{3}$ et $t = -\frac{1}{3}$.

Donc $P^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{4}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$.

b. On a $AP = \begin{pmatrix} 5 & -4 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 16 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$, puis

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{4}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 16 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

3. *Initialisation* : d'après la question précédente : $D = P^{-1}AP$, d'où en multipliant à gauche par P et à droite par P^{-1} :

$PD = AP$, puis $PDP^{-1} = A$: la relation est vraie au rang 1.

Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$, avec $n \geq 1$ et supposons que $A^n = PD^nP^{-1}$.

Alors en multipliant à gauche par P^{-1} , puis à droite par P , on obtient :

$P^{-1}A^nP = D^n$. Multiplions chaque membre par $D = P^{-1}AP$:

$P^{-1}APP^{-1}A^nP = D^{n+1}$; or $PP^{-1} = I_2$, d'où :

$P^{-1}AA^nP = D^{n+1}$ et en multipliant à gauche par P et à droite par P^{-1} :

$PP^{-1}A^{n+1}PP^{-1} = PD^{n+1}P^{-1}$, soit finalement :

$$A^{n+1} = PD^{n+1}P^{-1}.$$

La relation est donc vraie au rang $(n+1)$.

La relation est vraie au rang 1 et si elle est vraie à un rang n au moins égal à 1, elle est vraie au rang $n+1$: d'après le principe de récurrence pour tout entier naturel n non nul, $A^n = PD^nP^{-1}$.

4. $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$ et $D^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4^2 \end{pmatrix}$.

Démontrons par récurrence que $D^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4^n \end{pmatrix}$.

Initialisation : $D^1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$: la relation est vraie au rang 1.

Hérédité : soit n un entier naturel, $n \geq 1$ et supposons que $D^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4^n \end{pmatrix}$.

Alors $D^{n+1} = D^n \times D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4^n \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4^{n+1} \end{pmatrix}$.

La relation est vraie au rang $n+1$.

La relation est vraie au rang 1 et si elle est vraie au rang n , elle l'est au rang $n+1$: d'après le principe de récurrence $D^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4^n \end{pmatrix}$ pour tout naturel n non nul.

On a donc $A^n = PD^nP^{-1}$.

$$PD^n = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4^{n+1} \\ 1 & 4^n \end{pmatrix}, \text{ puis}$$

$$PD^nP^{-1} = A^n = \begin{pmatrix} 1 & 4^{n+1} \\ 1 & 4^n \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{4}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} + \frac{4^{n+1}}{3} & \frac{4}{3} - \frac{4^{n+1}}{3} \\ -\frac{1}{3} + \frac{4^n}{3} & \frac{4}{3} - \frac{4^n}{3} \end{pmatrix}.$$

5. On admettra que pour tout entier naturel n non nul, $V_n = A^n V_0$.

$$V_n = A^n V_0 \text{ ou encore } \begin{pmatrix} u_{n+1} \\ u_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} + \frac{4^{n+1}}{3} & \frac{4}{3} - \frac{4^{n+1}}{3} \\ -\frac{1}{3} + \frac{4^n}{3} & \frac{4}{3} - \frac{4^n}{3} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} u_1 \\ u_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} + \frac{4^{n+1}}{3} & \frac{4}{3} - \frac{4^{n+1}}{3} \\ -\frac{1}{3} + \frac{4^n}{3} & \frac{4}{3} - \frac{4^n}{3} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} + \frac{4^{n+1}}{3} \\ -\frac{1}{3} + \frac{4^n}{3} \end{pmatrix}. \text{ Donc } u_n = -\frac{1}{3} + \frac{4^n}{3}.$$

6. a. D'après le résultat précédent :

$$4u_n + 1 = 4 \left(-\frac{1}{3} + \frac{4^n}{3} \right) + 1 = -\frac{4}{3} + 1 + \frac{4^{n+1}}{3} = -\frac{1}{3} + \frac{4^{n+1}}{3} = u_{n+1}.$$

On a donc pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = 4u_n + 1$.

b. D'après la partie A :

$$\text{PGCD}(u_{n+1}, u_n) = \text{PGCD}(4u_n + 1; u_n) = \text{PGCD}(3u_n + 1; u_n) = \text{PGCD}(2u_n + 1; u_n) = \text{PGCD}(u_n + 1; u_n) = \text{PGCD}(1; u_n) = 1.$$

u_n et u_{n+1} sont premiers entre eux.

c. On a démontré à la question 5. que $u_n = -\frac{1}{3} + \frac{4^n}{3}$ soit en multipliant chaque membre par 3 : $3u_n = -1 + 4^n$ et par conséquent $3u_{n+1} = -1 + 4^{n+1}$.

$$\text{On a donc } \text{PGCD}(4^{n+1} - 1, 4^n - 1) = \text{PGCD}(3u_{n+1}; 3u_n).$$


$$\text{Comme } \text{PGCD}(u_{n+1}, u_n) = 1, \text{ PGCD}(3u_{n+1}; 3u_n) = 3 \times \text{PGCD}(u_{n+1}, u_n) = 3 \times 1 = 3.$$

Deux termes consécutifs de la suite $(4^n - 1)_{n \in \mathbb{N}}$ ont pour PGCD 3.

ANNEXE

À compléter et à remettre avec la copie

EXERCICE 3



EXERCICE 4 (spécialité)

$A \leftarrow 4^3 - 1$ $B \leftarrow 4^2 - 1$ Tant que $A \neq B$: Si $A > B$, alors : $A \leftarrow A - B$ Sinon : $B \leftarrow B - A$ Fin Si Fin Tant que
--