

Durée : 4 heures

## ∞ Baccalauréat C Dijon septembre 1969 ∞

### EXERCICE 1

Soit  $x$  et  $y$  appartenant à  $\mathbb{N}$ , ensemble des entiers naturels.  
Résoudre l'équation

$$9y^2 - (x+1)^2 = 32.$$

### EXERCICE 2

1. Résoudre, sur le corps,  $\mathbb{C}$ , des complexes, l'équation

$$z^2 - (1+2i)z + 3(1+i) = 0,$$

où  $z$  est l'inconnue et  $i$  le nombre complexe de module 1 et d'argument  $\frac{\pi}{2}$ .

2. Déterminer le module et l'argument des racines.

### PROBLÈME

Dans le plan, soit  $ABC$  un triangle supposé non rectangle en  $A$  et  $(\omega)$  le cercle de centre  $\omega$  circonscrit à ce triangle.

#### Partie A

1. Montrer qu'il existe un cercle unique,  $(R)$ , centré en  $R$  sur  $AC$  et passant par  $A$  et  $B$  et qu'il existe un cercle unique,  $(S)$ , centré en  $S$  sur  $AB$  et passant par  $A$  et  $C$ .

Les deux cercles  $(R)$  et  $(S)$  se coupent en  $A$  et  $I$ .

2. Montrer que  $AI$  passe par  $\omega$ .
3. Montrer que les points  $B, C, S, \omega, R$  et  $I$  sont sur un même cercle.

#### Partie B

On suppose que le triangle  $ABC$  est isocèle, avec  $AB = AC = 2a$ ; on pose  $\widehat{BAC} = 2\alpha$ , avec  $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ .

1. Déterminer en fonction de  $\alpha$  l'aire,  $y$ , du triangle  $\omega RS$ . On envisagera les deux cas suivants :

$$0 < \alpha < \frac{\pi}{4} \quad \text{et} \quad \frac{\pi}{4} < \alpha < \frac{\pi}{2}.$$

2. On suppose  $a = 1$ ; calculer cette aire  $y$  en fonction de  $x = \tan \alpha$  et étudier la fonction  $y = f(x)$  ainsi obtenue.  
Construire sa courbe représentative.

#### Partie C

1. Construire le triangle  $ABC$ , connaissant les points  $R, S$  et  $\omega$ . Discuter.
2. Comment faut-il choisir ces points pour que le triangle  $ABC$  soit isocèle ?