

# ☞ Baccalauréat ES Centres étrangers I juin 2002 ☞

Calculatrice autorisée

## EXERCICE 1

5 points

Commun à tous les candidats

Les détails des calculs effectués à la calculatrice ne sont pas demandés.

Sauf indication contraire, les valeurs obtenues seront données sous forme décimale arrondie à  $10^{-2}$  près.

Le tableau ci-dessous donne l'évolution de la population d'une petite ville proche d'une métropole en pleine expansion.

Année	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000
Rang de l'année ( $x_i$ )	0	5	10	15	20	25	30	35
Population ( $y_i$ )	5 400	5 600	7 000	8 000	8 750	11 200	13 900	15 000

- Le plan est rapporté à un repère orthogonal :
  - Sur l'axe des abscisses, on placera 0 à l'origine et on choisira 2 cm pour 5 années ;
  - Sur l'axe des ordonnées, on placera 5 000 à l'origine et on choisira 1 cm pour 1 000 habitants.
  - Représenter le nuage de points associé à la série statistique  $(x_i ; y_i)$ .
  - Déterminer les coordonnées du point moyen G de la série statistique  $(x_i ; y_i)$  et placer ce point sur le graphique.
  - Déterminer l'équation de la droite  $\mathcal{D}$  d'ajustement de  $y$  en  $x$  par la méthode des moindres carrés. Tracer  $\mathcal{D}$  sur le graphique précédent.
  - En supposant que ce modèle reste pertinent jusqu'en 2020, quelle serait la population de cette ville, à une unité près, en 2020?
- Après l'avoir recopié, compléter le tableau suivant :

Rang de l'année ( $x_i$ )	0	5	10	15	20	25	30	35
$z_i = \ln(y_i)$								

- Déterminer le coefficient de corrélation linéaire de la série statistique  $(x_i ; z_i)$ .
  - Déterminer l'équation de la droite d'ajustement de  $z$  en  $x$  par la méthode des moindres carrés.
  - En supposant que ce second modèle reste pertinent jusqu'en 2020, donner une nouvelle prévision, à une unité près, de la population de cette ville en 2020.
- Les crédits alloués par l'État aux municipalités étant proportionnels au nombre d'habitants, quel modèle permet la prévision la plus favorable aux finances de la ville en 2020?

## EXERCICE 2

5 points

Candidats n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité

Dans cet exercice, les résultats seront donnés sous forme de fractions irréductibles.

Un jeu consiste à lancer de la main gauche, une balle dans un seau. Parmi l'ensemble des joueurs,  $\frac{5}{6}$  sont droitiers et  $\frac{1}{6}$  sont gauchers.

Pour un joueur droitier, la probabilité de mettre la balle dans le seau est  $\frac{1}{4}$ .

Pour un joueur gaucher, cette probabilité est  $\frac{1}{2}$ .

1. On choisit au hasard un individu dans cette population. On note :
  - G l'évènement « l'individu choisi est gaucher »,
  - S l'évènement « l'individu met la balle dans le seau ».
  - a. Déterminer la probabilité de l'évènement  $G \cap S$ .
  - b. Calculer la probabilité de l'évènement S.
  - c. Calculer la probabilité que la personne choisie soit droitère, sachant qu'elle a mis la balle dans le seau.
2. Dans cette question on a sélectionné Paul qui est un joueur droitier. Il lance deux balles l'une après l'autre; on suppose les deux lancers indépendants. Soit  $X$  la variable aléatoire égale au nombre de balles dans le seau après les deux lancers.
  - a. Déterminer les valeurs prises par  $X$
  - b. Déterminer la loi de probabilité de  $X$ .
  - c. Calculer l'espérance mathématique  $E(X)$ .

**EXERCICE 2****5 points****Candidats ayant suivi l'enseignement de spécialité**

On considère une suite  $(u_n)$  définie sur  $\mathbb{N}$  par :

$$\begin{cases} u_0 = 6 \\ u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 2 \end{cases}$$

On pose  $v_n = u_n - 3$ .

1. a. Montrer que la suite  $(v_n)$  est une suite géométrique dont on déterminera le premier terme  $v_0$  et la raison.
  - b. Exprimer  $v_n$  puis  $u_n$  en fonction de  $n$ .
  - c. Dédurre, en utilisant la question précédente,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ .
2. On constate que, pour tout  $n$  appartenant à  $\mathbb{N}$ ,  $v_n$  est strictement positif et on pose  $w_n = \ln v_n$ . Démontrer que  $(w_n)$  est une suite arithmétique dont on déterminera le premier terme et la raison.
  - a. Exprimer  $w_n$  en fonction de  $n$ .
  - b. Pour quelle valeur de  $n$  a-t-on :  $w_n = -\ln(27^3) - \ln 9$ ?

**PROBLÈME****10 points****Commun à tous les candidats****Partie A**

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par

$$f(x) = (ax + b)e^{cx}, \text{ où } a, b \text{ et } c \text{ sont des nombres réels.}$$

On note  $\mathcal{C}$  la courbe représentative de  $f$  dans un repère orthonormal  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

1. Calculer  $a$ ,  $b$  et  $c$  pour que la courbe  $\mathcal{C}$  passe par le point A  $\left(-\frac{1}{2}; 0\right)$ , par le point B(0; 1) et qu'elle admette en B une tangente ayant un coefficient directeur égal au nombre 1.
2. On supposera désormais que  $f$  est définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = (2x + 1)e^{-x}$ .

- a. Déterminer la limite de  $f$  en  $-\infty$  et en  $+\infty$ . En déduire l'existence d'une asymptote pour  $\mathcal{C}$ .
- b. Étudier les variations de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .
3. Résoudre, sur  $\mathbb{R}$ , l'équation  $f(x) = 0$  et en déduire le signe de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .
4. Montrer que, sur l'intervalle  $\left[\frac{1}{2}; 2\right]$ , l'équation  $f(x) = 1$  a une solution unique  $\alpha$ .  
Donner la valeur décimale arrondie à  $10^{-1}$  de  $\alpha$ .
5. Écrire une équation de la tangente  $\mathcal{T}$  à  $\mathcal{C}$  au point B.
6. Tracer  $\mathcal{C}$  et  $\mathcal{T}$  dans le repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  (unité graphique 2 cm).

### Partie B

On donne la fonction  $F$  définie sur  $\mathbb{R}$  par

$$F(x) = (-2x - 3)e^{-x} + 3.$$

1. Montrer que  $F$  est la primitive sur  $\mathbb{R}$  de  $f$  qui s'annule pour  $x = 0$ .
2. Calculer, en  $\text{cm}^2$ , la valeur exacte de l'aire de la partie du plan limitée par la courbe  $\mathcal{C}$ , l'axe des abscisses et les droites d'équation  $x = -\frac{1}{2}$  et  $x = 1$ .  
Donner une valeur approchée de cette aire à  $10^{-2}$  près.