

FESIC - Puissance alpha - 2018

Instructions aux candidats

Durée de l'épreuve : 2 h

Chaque épreuve contient 16 exercices indépendants.

Le candidat doit répondre à 12 exercices sur les 16 qui lui sont présentés, ce qui lui permet d'éliminer les exercices qui porteraient sur une partie du programme non traitée à la date des épreuves écrites.

S'il répond à plus de 12 exercices, seuls les 12 premiers seront corrigés.

Chaque exercice comporte 4 affirmations signalées par les lettres a, b, c, d.

Pour chacune des affirmations :

- Le candidat indique si l'affirmation est vraie (V) ou fausse (F), ou il s'abstient;
- Un exercice est considéré comme traité dès qu'une réponse V ou F à l'une des 4 affirmations est donnée;
- Toute bonne réponse rapporte un point, toute réponse inexacte entraîne le retrait d'un point;
- L'abstention et l'annulation ne sont pas considérées comme des réponses, elles ne rapportent ni ne retirent aucun point;
- Une bonification d'un point est ajoutée chaque fois qu'un exercice est traité correctement (c'est à dire si le candidat a fourni 4 réponses exactes à l'exercice).

Exercice n° 1 _____

Bases en analyse

Les quatre questions suivantes sont indépendantes.

- a) La dérivée de $x \mapsto x \times e^x$ est $x \mapsto e^x$.
- b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x) - 1}{x} = +\infty$
- c) Soit f une fonction définie sur \mathbb{R} . Si $f' = f$, alors f est la fonction nulle.

Soit A et B deux événements d'une même expérience aléatoire tels que $P(A) = 0,2$, $P(B) = 0,5$ et $P(A \cup B) = 0,7$.

- d) A et B sont incompatibles.

Exercice n° 2 _____

Bases en géométrie

Pour le a) et b), on se place dans le plan complexe $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

Les questions a) et b) sont indépendantes.

- a) Si $z = -6 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right)$ alors $\arg(z) = \frac{2\pi}{3} + [2\pi]$.
- b) Si M est un point d'affixe z de partie imaginaire non nulle et M' un point d'affixe $z' = -z$, alors M et M' sont symétriques par rapport à O .

Pour le c) et d), on se place dans le repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace.

On pose (\mathcal{P}_1) et (\mathcal{P}_2) les plans d'équations respectives $4x + 6y - 10z + 3 = 0$ et $-6x - 9y + 15z - 8 = 0$.

Soit (d) la droite de représentation paramétrique $\begin{cases} x = 2t + 1 \\ y = -t - 3 \\ z = 5t - 1 \end{cases}$ où t désigne un nombre réel.


c) (\mathcal{P}_1) et (\mathcal{P}_2) sont sécants.

d) Le point A $(2; 3; -5)$ appartient à la droite (d) .

Exercice n° 3

Lecture graphique

On considère la représentation graphique \mathcal{C} d'une fonction f définie sur \mathbb{R} ainsi que la tangente à cette courbe au point A de coordonnées $(0; 1)$.



a) $f'(0) = 1$


b) $f'(1) = 1,5$

c) L'équation $f(x) = x$ possède une unique solution sur $[-1,5; 4]$.

d) $2 \leq \int_{-1}^2 f(x) dx \leq 4$

Exercice n° 4**Volume d'un parallélépipède rectangle**


On veut réaliser, dans l'angle d'un plan de travail, un placard ayant la forme d'un parallélépipède rectangle. Pour des raisons pratiques, si sa largeur est x , sa profondeur est $12 - x$ et la hauteur est égale à la profondeur.



On suppose $x \in [0 ; 12]$ (les dimensions sont exprimées en dm).

a) Le volume $V(x)$ en dm^3 de ce placard est égal à $V(x) = (-12x + x^2) \times (x - 12)$.

On pose f la fonction définie sur $[0 ; 12]$ par $f(x) = x^3 - 24x^2 + 144x$ de courbe représentative (\mathcal{C}) ci-dessous.



b) Pour tout x appartenant à l'intervalle $[0 ; 12]$, $f'(x) \geq 0$.

c) $V(x) = 2 \times f(x)$

d) Dans le cas particulier où le parallélépipède rectangle serait un cube, son volume serait compris entre 200 et 225 dm^3 .

Exercice n° 5**Utilisation d'une suite dans un algorithme.**

On considère la suite (u_n) définie sur \mathbb{N} par $u_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{1}{2}(u_n - n) - 1$.
On donne l'algorithme suivant :

Entrée : n est un entier naturel
 Initialisation : u prend la valeur 1
 i prend la valeur 0
 Traitement : Tant que $i < n$
 | u prend la valeur $\frac{1}{2}(u - i) - 1$
 | i prend la valeur $i + 1$
 Fin Tant que
 Sortie : Afficher u

a) Pour $n = 3$, l'algorithme nous donne la tableau suivant :

n	u	i
3	1	0
3	$-\frac{1}{2}$	1
3	$-\frac{7}{4}$	2
3	$-\frac{23}{4}$	3

b) Pour $n = 3$, l'algorithme calcule u_n .

On considère la suite (v_n) définie sur \mathbb{N} par $v_n = u_n + n$.

c) La suite (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et de premier terme $v_0 = 1$.

d) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{1}{2^n} + n$.

Exercice n° 6**Utilisation d'un algorithme avec les complexes.**

On se place dans le plan complexe $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

On donne l'algorithme suivant :

Entrée : θ est un nombre réel
 a est un nombre réel
 b est un nombre réel
 a' est un nombre réel
 b' est un nombre réel

Traitement : a' prend la valeur $a \times \cos(\theta)$
 a' prend la valeur $a' - b \times \sin(\theta)$
 b' prend la valeur $a \times \sin(\theta)$
 b' prend la valeur $b' + b \times \cos(\theta)$

Sortie : Afficher a'
Afficher b'

Pour le **a)** et **b)** on suppose $\theta = \frac{\pi}{3}$, $a = 1$ et $b = 1$.

$$\text{a) } a' = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$$

$$\text{b) } b' = \frac{\sqrt{3}+1}{2}$$

Dans toute la suite on posera M le point d'affixe $z = a + ib$ et M' le point d'affixe $z' = a' + ib'$ avec a' et b' les deux nombres obtenus dans l'algorithme précédent.

$$\text{c) Si } \theta = \frac{\pi}{3}, a = 1 \text{ et } b = 1 \text{ alors } |z| = \sqrt{2}.$$

$$\text{d) Dans le cas général où } \theta \in \mathbb{R}, z' = e^{i\theta} z.$$

Exercice n° 7

Bases de logique

Pour le **a)** et **b)** on suppose z un nombre complexe et Γ un sous-ensemble de \mathbb{C} .

$$\text{a) } z \neq 0 \text{ si et seulement si } \operatorname{Re}(z) \neq 0 \text{ et } \operatorname{Im}(z) \neq 0.$$

$$\text{b) La contraposée de « si } z \in \Gamma \text{ alors } \operatorname{Re}(z) = 0 \text{ » est « si } \operatorname{Re}(z) = 0 \text{ alors } z \in \Gamma \text{ ».}$$

Pour le **c)** et **d)** on suppose f une fonction définie sur $I = [-3; 5]$.

$$\text{c) Si } f(-3) < 0 \text{ et } f(5) > 0 \text{ alors l'équation } f(x) = 0 \text{ admet au moins une solution sur } I.$$

$$\text{d) Si } f \text{ admet une primitive sur } I = [-3; 5] \text{ alors } f \text{ est continue sur } I = [-3; 5].$$

Exercice n° 8

Calculs de limites

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow -\infty} \exp(x) = -\infty$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{1}{x^2}\right) = 0$$

$$\text{c) Si, pour tout réel } x \text{ non nul, } \frac{1}{x} \leq f(x) \leq \frac{x-1}{x^2+1} \text{ alors } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

$$\text{d) } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin(x) - 1}{x - \frac{\pi}{2}} = 1$$

Exercice n° 9**Calculs d'intégrales**

$$\text{a) } \int_2^4 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 4 + 2 \times \sqrt{2}$$

$$\text{b) } \int_0^1 \frac{2x}{x^2+1} = \ln(2)$$

c) La fonction $x \mapsto (x^2 - 2x + 2) \times e^x - 2$ est une primitive définie sur \mathbb{R} de la fonction $x \mapsto x^2 \times e^x$.

$$\text{d) } \int_0^1 x^2 \times e^x dx = 3e - 2$$

Exercice n° 10**Notions de base sur les nombres complexes**

On se place dans le plan complexe $(O; \vec{u}, \vec{v})$. On considère A le point d'affixe $z_A = -2i$, B le point d'affixe $z_B = -2$ et E le point d'affixe $z_E = 2 + 2i\sqrt{3}$.

a) L'écriture trigonométrique de $2 + 2i\sqrt{3}$ est $4 \left(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \right)$.

b) E est situé sur le cercle de centre O et de rayon $R = 2$.

c) L'ensemble des points M d'affixe z tels que $|z + 2i| = |2 + z|$ est la médiatrice du segment [AB].

d) L'ensemble des points M d'affixe z tels que $2z\bar{z} = 1$ est un cercle de rayon 2.

Exercice n° 11**Utilisation des nombres complexes en géométrie**

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

Soit f la transformation du plan complexe qui, à tout point M d'affixe $z \neq 0$, associe le point M' d'affixe $z' = 1 + \frac{i}{z}$.

a) L'image par f du point A d'affixe $z_A = 1 + i$ est le point A' d'affixe $z_{A'} = \frac{3}{2} + \frac{1}{2}i$.

Dans toute la suite, on pose $z = x + iy$ avec $x \neq 0$ et $y \neq 0$ et $z' = x' + iy'$ avec $x', y' \in \mathbb{R}$.

$$\text{b) } \operatorname{Re}(z') = x' = \frac{x^2 + y^2 + y}{x^2 + y^2}$$

$$\text{c) } \operatorname{Im}(z') = y' = \frac{x}{x^2 + y^2}$$

d) L'ensemble des points M d'affixe $z \neq 0$ tel que z' soit un imaginaire pur est le cercle (\mathcal{C}) de centre A $\left(0; -\frac{1}{2}\right)$ et de rayon $R = \frac{1}{2}$ privé du point O.

Exercice n° 12**Étude d'une fonction logarithme**

On considère la fonction f définie par : $f(x) = \ln(1 - x^2)$.

On note D l'ensemble de définition de f .

- a) $1 - x^2 \geq 0$ si et seulement si $-1 \leq x \leq 1$.
- b) $D = [-1 ; 1]$
- c) La fonction f a pour fonction dérivée la fonction f' définie sur D par $f'(x) = \frac{1}{1 - x^2}$.
- d) L'équation $f(x) = 1$ a pour solutions $x = \sqrt{e - 1}$ et $x = -\sqrt{e - 1}$.

Exercice n° 13**Étude d'une fonction exponentielle**

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{e^{2x}}{x^2 + 1}$. On désigne par \mathcal{C}_f la courbe représentative de f dans un repère orthonormal du plan.

- a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$
- b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$
- c) La fonction f a pour fonction dérivée la fonction f' définie sur \mathbb{R} par $f'(x) = \frac{2(x^2 - x + 2)}{(e^{-x}(x^2 + 1))}$.
- d) f est croissante sur $] -\infty ; 0]$ et décroissante sur $[0 ; +\infty[$.

Exercice n° 14**Bases en probabilités**

On considère dans **a)** deux événements E et F d'une même expérience aléatoire.

a) $P_{\bar{F}}(E) = 1 - P_F(E)$

Pour le **b)**, **c)** et **d)**, nous utiliserons les hypothèses suivantes :

Une urne contient 5 boules blanches et 3 boules noires. Un joueur tire au hasard une boule dans l'urne.

Si la boule est blanche, il lance un dé tétraédrique dont les faces numérotées de 1 à 4 ont la même probabilité d'apparition.

Si la boule est noire, il lance un jeton dont les faces numérotées de 1 à 2 ont la même probabilité d'apparition.

On considère les événements suivants :

G : « Le joueur obtient le numéro 1 », B : « Le joueur tire une boule blanche ».

- b) $P(B \cap G) = \frac{5}{32}$
- c) $P(G) = \frac{13}{32}$
- d) $P_G(B) = \frac{5}{11}$

Exercice n° 15**Différentes lois de probabilités**

- a) Soit X une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur l'intervalle $[0 ; 5]$.

$$P\left(1 \leq X \leq \frac{5}{2}\right) = 0,4$$

- b) Soit Y une variable aléatoire suivant une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$.

$$\text{Pour tout } c \in \mathbb{R}_+, P(Y > c) = e^{-\lambda c}.$$

- c) Soit T une variable aléatoire suivant une loi exponentielle de paramètre $\lambda = \frac{1}{10}$.

$$P(T \leq 10) = 1 - \frac{1}{e}$$

- d) Soit Z une variable aléatoire suivant une loi normale $\mathcal{N}(\mu ; \sigma^2)$ et vérifiant

$$P(0 \leq Z \leq 2) = 0,75.$$

La loi de Z n'est pas la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0 ; 1)$.

Exercice n° 16**Repérage dans l'espace**

Dans l'espace muni d'un repère orthonormé $(O ; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ on considère le plan \mathcal{P} d'équation cartésienne $x + 2y + 3z - 2 = 0$ et la droite \mathcal{D} dont une représentation paramétrique est, pour tout réel t ,

$$\begin{cases} x = t \\ y = 2 - 3t \\ z = -3 - t \end{cases}.$$

- a) Le point A $(-1 ; 3 ; -2)$ appartient à \mathcal{D} .

- b) Le plan \mathcal{P} et la droite \mathcal{D} sont sécants au point B de coordonnées $(-3 ; 4 ; -1)$.

- c) La droite \mathcal{D}' , de représentation paramétrique $\begin{cases} x = k \\ y = -2k + 1 \\ z = k \end{cases}$ pour tout réel k , est sécante au plan \mathcal{P} .

- d) Les droites \mathcal{D} et \mathcal{D}' sont coplanaires.