

Durée : 4 heures

∞ Baccalauréat C Métropole groupe 4¹ juin 1993 ∞

EXERCICE 1

5 points

Soit un plan P rapporté à un repère orthonormal direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$. Pour tout point M de coordonnées $(x; y)$, on désigne par $z = x + iy$ son affixe. On note A et B les points d'affixes respectives i et $-2i$. Soit f l'application du plan P privé de A dans P qui à tout point M d'affixe z distincte de i associe le point M' d'affixe z' définie par :

$$z' = \frac{2z - i}{iz + 1}.$$

1. Soit z un nombre complexe différent de i .
 - a. On désigne respectivement par r et θ le module et un argument de $z - i$. Interpréter géométriquement r et θ à l'aide des points A et M .
 - b. Montrer que $(z' + 2i)(z - i) = 1$.
 - c. On désigne respectivement par r' et θ' le module et un argument de $z' + 2i$. Exprimer r' et θ' en fonction de r et de θ .
Interpréter géométriquement r' et θ' à l'aide des points B et M' .
2. Soit \mathcal{C} le cercle de centre A et de rayon 1.
 - a. Montrer que si M appartient à \mathcal{C} , son image M' appartient à un cercle \mathcal{C}' de centre B dont on donnera le rayon.
 - b. Le cercle \mathcal{C}' est-il l'image par f du cercle \mathcal{C} ?
3. Soit T le point d'affixe $\frac{\sqrt{2}}{2} + \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)i$.
 - a. Calculer l'affixe de \overrightarrow{AT} ; en déduire que T appartient au cercle \mathcal{C} .
 - b. Déterminer une mesure en radians de l'angle $(\vec{u}, \overrightarrow{AT})$.
Tracer le cercle \mathcal{C} et placer le point T (unité graphique : 2 cm).
 - c. En utilisant les questions précédentes, construire l'image T' du point T par f .

EXERCICE 2

4 points

On dispose d'un dé cubique dont chaque face a la même probabilité d'apparaître. Le dé possède trois faces rouges, une face orange et deux faces vertes.

Un jeu consiste à lancer une fois le dé.

La règle est la suivante : le joueur mise 10 F;

- si la face supérieure du dé est rouge, il ne reçoit rien;
- si la face supérieure du dé est orange, il reçoit 10 F;
- si la face supérieure du dé est verte, il reçoit m francs (m est un entier naturel strictement supérieur à 10).

On appelle gain algébrique du joueur la différence entre ce qu'il reçoit à l'issue d'une partie et sa mise; on désigne par X la variable aléatoire associant à chaque lancer ce gain algébrique.

1. Quelles sont les valeurs prises par X?
Déterminer la loi de probabilité de X.

2. Déterminer, en fonction de m , l'espérance mathématique de X .
Le jeu est dit « équitable » si l'espérance mathématique de X est nulle; déterminer m pour qu'il en soit ainsi.
3. L'entier naturel n étant supérieur ou égal à 2, un joueur effectue n lancers consécutifs indépendants.
 - a. Pour un lancer donné, montrer que la probabilité d'obtenir un gain algébrique strictement positif est $p = 1/3$.
 - b. Déterminer en fonction de n , la probabilité p_n pour que ce joueur obtienne au moins une fois un gain algébrique strictement positif à l'issue des n lancers.
 - c. Déterminer le plus petit entier N tel que :

$$p_N \geq 0,99.$$

PROBLÈME**11 points**

On désigne par f la fonction numérique définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}.$$

On se propose d'étudier la fonction f puis, dans la deuxième partie, deux suites numériques liées à f .

On appelle (\mathcal{C}) la courbe représentative de f dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité graphique : 1 cm).

Partie A**Étude et courbe représentative de f**

1. a. Étudier le sens de variation de f .
b. Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
Dresser le tableau de variation de f .
c. Tracer la courbe (\mathcal{C}) ; on précisera ses asymptotes.
2. On désigne par (T) la tangente à la courbe (\mathcal{C}) au point d'abscisse 1.
 - a. Déterminer une équation de (T).
 - b. On désigne par g la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$g(x) = (x-1) - f(x).$$

Calculer $g'(x)$ et vérifier que $g'(x) = \frac{1}{2x\sqrt{x}} [\ln x + 2(x\sqrt{x} - 1)]$.

Calculer $g'(1)$ et étudier le signe de $g'(x)$ sur chacun des intervalles $]0; 1[$ et $]1; +\infty[$.

- c. Calculer $g(1)$ et, à l'aide du sens de variation de g , étudier le signe de $g(x)$.
En déduire la position de la courbe (\mathcal{C}) par rapport à la droite (T).

Partie B**Étude de suites**

Pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 8, on pose :

$$u_n = f(8) + f(9) + \dots + f(n) = \sum_{k=8}^n f(k).$$

On rappelle que, la fonction f étant continue sur $]0 ; +\infty[$, l'intégrale $\int_a^b f(t) dt$ existe quels que soient les nombres a et b strictement positifs.

1. a. Soit k un entier supérieur ou égal à 8. Démontrer que :

$$f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f(t) dt \leq f(k).$$

- b. En déduire que, pour tout entier $n \geq 8$,

$$u_{n+1} - f(8) \leq \int_8^{n+1} f(t) dt \leq u_n$$

- c. À l'aide d'une intégration par parties, calculer :

$$I_n = \int_8^{n+1} f(t) dt.$$

- d. Déduire des questions b. et c. que la suite (u_n) tend vers $+\infty$ quand n tend vers $+\infty$.

2. Pour tout entier n supérieur ou égal à 8, on pose :

$$v_n = u_n - \int_8^{n+1} f(t) dt.$$

- a. Étudier le sens de variation de la suite (u_n) et en déduire que :

$$u_n - f(8) \leq \int_8^{n+1} f(t) dt \leq u_n,$$

puis que la suite (v_n) est bornée.

- b. En utilisant la question 1. a., démontrer que la suite (v_n) est croissante.

- c. Justifier que la suite (v_n) est convergente et démontrer que sa limite ℓ vérifie :

$$0 \leq \ell \leq 0,74.$$