

Durée : 4 heures

☞ Baccalauréat C juin 1975 Nice ☞

EXERCICE 1

Soit \mathcal{E} un espace affine euclidien de dimension 3. On donne trois points distincts A, B, C de \mathcal{E} . Soit f l'application de \mathcal{E} dans \mathbb{R} définie par :

$$M \longmapsto f(M) = 2 \|\overrightarrow{MA}\|^2 + 3 \|\overrightarrow{MB}\|^2 - 2 \|\overrightarrow{MC}\|^2.$$

1. Justifier l'existence de G barycentre des points A, B, C, affectés respectivement des coefficients 2, 3, -2.
Donner une relation vérifiée par les vecteurs \overrightarrow{GA} , \overrightarrow{GB} , \overrightarrow{GC} .
2. Montrer que $f(M) = 3 \|\overrightarrow{MG}\|^2 + k$ où $k = f(G)$.
3. Discuter suivant les valeurs de k , la nature de l'ensemble des points M de \mathcal{E} tels que $f(M) = 4$.

EXERCICE 2

On considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie par :

$$f(x) = \frac{|x^2 + x| + 1}{|x| + 1}$$

1. Étudier la dérivabilité de f en $x_0 = 0$ et $x_1 = -1$.
2. Représentation graphique de f en repère orthonormé. On précisera en particulier les asymptotes à la courbe représentative.

PROBLÈME

Les parties A, B et C peuvent être traitées indépendamment l'une de l'autre.

Partie A

Dans l'ensemble \mathbb{C} des nombres complexes, on définit l'opération T de la façon suivante :
si $z = \alpha + i\beta$ et $z' = \alpha' + i\beta'$ sont deux éléments quelconques de \mathbb{C} ,

$$z \text{ T } z' = \alpha\alpha' + i(\alpha\beta' + \beta\alpha')$$

1. Montrer que $(\mathbb{C}, +, \text{T})$ est un anneau commutatif.
2. Si $u = \gamma + i\delta$ et $u' = \gamma' + i\delta'$ sont deux nombres complexes donnés, résoudre et discuter l'équation d'inconnue z :

$$(1) \quad u \text{ T } z = u' \quad \text{où } z \in \mathbb{C}.$$

On montrera que si u est imaginaire pur, l'équation est impossible ou indéterminée. Lorsqu'il y a indétermination, donner toutes les solutions.

3. Pour tout nombre complexe z , on pose $z^{[0]} = 1$ et on définit par récurrence $z^{[n]} = z \text{ T } z^{[n-1]}$ pour tout entier $n \geq 1$. Calculer :
 - a. $i^{[n]}$

- b. $(\alpha + i\beta)^{[n]}$
puis résoudre et discuter l'équation :

$$z^{[n]} = u'.$$

où u' est un nombre complexe donné, où z est l'inconnue complexe et $n \geq 2$.

4. On considère l'ensemble \mathcal{M} des matrices de la forme $M = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & \alpha \end{pmatrix}$ où $(\alpha; \beta) \in \mathbb{R}^2$, muni de l'addition et de la multiplication des matrices.
Montrer que $(\mathcal{M}, +, \times)$ est un anneau isomorphe à $(\mathbb{C}, +, \cdot)$.

Partie B

Soit E un espace vectoriel euclidien de dimension 2, muni d'une base (\vec{i}, \vec{j}) orthonormée. On note 0_E le vecteur nul de E .

On note $f_{\alpha, \beta}$ l'application linéaire de E dans E dont la matrice dans la base (\vec{i}, \vec{j}) est $M = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & \alpha \end{pmatrix}$.

- Quelles sont les applications $f_{\alpha, \beta}$ involutives?
- a. Discuter suivant les valeurs de α et β la nature du noyau de $f_{\alpha, \beta}$ (on rappelle que le noyau de $f_{\alpha, \beta}$ est l'ensemble des vecteurs \vec{u} de E tels que $f_{\alpha, \beta}(\vec{u}) = 0_E$).
b. Pour quelles valeurs de α et β , $f_{\alpha, \beta}$ est-elle bijective?
- On prend $\alpha = 1$ et $\beta = 1$.

- a. Écrire la matrice M sous la forme $I + A$ où $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

- b. Montrer que A est la matrice de l'application composée $p \circ s$ où s désigne la symétrie orthogonale par rapport à la droite vectorielle de base $\vec{i} + \vec{j}$ et où p est la projection orthogonale sur une droite que l'on précisera.

Partie C

Soit \mathcal{E} un espace affine euclidien associé à E et rapporté au repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ où (\vec{i}, \vec{j}) est la base de E définie en B.

Soit F l'application affine de \mathcal{E} dans \mathcal{E} associée à $f_{1, 1}$ et telle que $F(O) = O$.

Soit P la courbe d'équation $2X - Y^2 = 0$ dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

- Quelle est la nature de P ? La représenter graphiquement dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
- a. Montrer que l'image réciproque Q de P par F admet pour équation :

$$2X + 1 = (Y - 1)^2.$$

- b. Quelle est la nature de Q ? Représenter cette courbe sur le même dessin que P .
- Calculer l'aire de la portion de plan comprise entre la courbe Q et l'axe des y .