

œ Baccalauréat C novembre 1990 œ
Nouvelle-Calédonie

EXERCICE 1

4 points

Soit (ABC) un triangle rectangle en A , tel que $AB = a$ et $AC = 3a$ (où $a > 0$). On fera une figure en prenant $a = 2$ cm.

1. Construire le barycentre G du système $\{(A, -5)(B, 6)(C, 2)\}$.
2. Calculer GA^2 , GB^2 et GC^2 en fonction de a .
3. Déterminer et construire l'ensemble (Γ) des points M vérifiant

$$-5MA^2 + 6MB^2 + 2MC^2 = 12a^2.$$

EXERCICE 2

4 points

À tout nombre complexe z , on associe le nombre complexe $f(z)$ défini par :

$$f(z) = 2z - \bar{z}.$$

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$. On fera une figure en prenant 1 cm pour unité.

Soit (\mathcal{C}) le cercle de centre $\Omega(3; 0)$ et de rayon 3.

1.
 - a. Déterminer l'ensemble (\mathcal{E}) des points M d'affixe z tels que $|f(z) - 3| = 3$.
Préciser la nature de (\mathcal{E}) et ses éléments caractéristiques : centre, axes, sommets, excentricité, foyers et directrices.
 - b. Représenter (\mathcal{E}) .
2. Soient P le point d'affixe $3e^{i\frac{\pi}{3}}$ et Q le point dont l'affixe α vérifie $f(\alpha) = 3e^{i\frac{\pi}{3}}$.
 - a. Montrer que P appartient à (\mathcal{C}) et en déduire que Q appartient à (\mathcal{E}) .
 - b. Déterminer α et donner sa forme trigonométrique. Faire figurer P et Q sur le dessin.

PROBLÈME

12 points

Partie I

On se propose de résoudre l'équation différentielle

$$(E) \quad y' - 2y = -\frac{2}{1 + e^{-2x}}.$$

1. Déterminer la solution de l'équation $y' - 2y = 0$ qui prend la valeur 1 en 0.
2. Soit f une fonction dérivable sur \mathbb{R} , telle que $f(0) = \ln(2)$, et soit g la fonction définie par l'égalité

$$f(x) = e^{2x}g(x).$$

- a. Calculer $g(0)$.

- b. Calculer $f'(x)$ en fonction de $g'(x)$ et de $g(x)$.
 c. Montrer que f est solution de E si, et seulement si

$$g'(x) = \frac{-2e^{-2x}}{1+2^{-2x}}.$$

- d. En déduire l'expression de $g(x)$, puis celle de $f(x)$ de telle sorte que f soit solution de (E).

Partie II

Étude sur \mathbb{R} de la fonction f définie par

$$f(x) = e^{2x} \ln(1 + e^{-2x}).$$

1. On pose : $h(x) = \ln(1 + e^{-2x})$.
 - a. Étudier la limite de h en $+\infty$.
 - b. Étudier le sens de variation de h .
 - c. En déduire le signe de $h(x)$ pour tout x réel.
2. Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x)$ est du signe de $h(x)$.
3. Étudier la limite de f en $+\infty$.
 Montrer que $f(x) = e^{2x} [-2x + \ln(1 + e^{2x})]$.
 En déduire la limite de f en $-\infty$.
4. Dresser le tableau de variations de f .
5. Représenter graphiquement la fonction f dans un repère orthonormé en prenant 5 cm pour unité. Préciser la tangente au point d'abscisse nulle.

Partie III

1. En remarquant que $\frac{1}{1+e^{-2x}} = \frac{e^{2x}}{1+e^{2x}}$ déterminer une primitive de la fonction $x \mapsto \frac{1}{1+e^{-2x}}$.
2. Calculer, à l'aide d'une intégration par parties, l'aire (en cm^2) de la portion de plan comprise entre l'axe des abscisses, la courbe représentative de la fonction f définie au II., et les droites d'équations $x = -1$ et $x = 0$.
 On donnera la valeur exacte de cette aire, ainsi qu'une valeur approchée à 10^{-3} près.

Partie IV

On définit la suite (u_n) par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout $n \geq 0$ (où f est la fonction définie au II.).

1. Montrer que $f([0; 1]) \subset [0; 1]$, et en déduire que, pour tout $n \geq 0$, on a $u_n \in [0; 1]$.
2. Montrer, par récurrence, que la suite (u_n) est croissante. En déduire qu'elle converge.
3. Soit α sa limite. Montrer que $f(\alpha) = \alpha$ et $\alpha \in [0; 1]$.
4. Grâce à la représentation graphique de f , donner une valeur approchée de α à 10^{-1} près.