

Durée : 4 heures

∞ **Baccalauréat C République Centrafricaine** ∞
septembre 1969

EXERCICE 1

Déterminer le domaine de définition et étudier les variations de la fonction f donnée par

$$f(x) = x + \text{Log}(2 - e^x).$$

Représenter graphiquement cette fonction.

Déterminer l'ensemble des points du plan dont les coordonnées $(x; y)$ sont solutions de l'inéquation

$$e^{y-x} + e^x > 2.$$

EXERCICE 2

Trois ensembles E_1, E_2 et E_3 sont composés respectivement de n_1, n_2 et n_3 éléments (n_1, n_2 et n_3 entiers positifs); on désigne par

p_1 le nombre d'éléments de l'ensemble $E_2 \cap E_3 = I_1$

p_2 le nombre d'éléments de l'ensemble $E_3 \cap E_1 = I_2$

p_3 le nombre d'éléments de l'ensemble $E_1 \cap E_2 = I_3$,
puis on pose

$$d(E_2, E_3) = n_2 + n_3 - 2p_1, d(E_3, E_1) = n_3 + n_1 - 2p_2, d(E_1, E_2) = n_1 + n_2 - 2p_3.$$

1. Montrer que $d(E_2, E_3)$ est nul si, et seulement si, les ensembles E_2 et E_3 sont égaux.
2. Montrer que le nombre N défini par

$$N = d(E_1, E_2) + d(E_3, E_1) - d(E_2, E_3)$$

est positif ou nul.

PROBLÈME

1. a. Déterminer l'ensemble de définition commun aux deux fonctions f_1 et f_2 données par

$$f_1(x) = \frac{1}{2}(-3x + 1 + \sqrt{6x - 3}),$$
$$f_2(x) = \frac{1}{2}(-3x + 1 - \sqrt{6x - 3}).$$

Étudier les variations de chacune de ces fonctions; les représenter dans un même plan rapporté, à un repère cartésien. (La réunion de ces deux graphiques est une parabole P ; les candidats n'ont pas à le démontrer.)

- b. Montrer que f_2 admet une fonction réciproque; indiquer son intervalle de définition; en est-il de même pour f_1 ? Donner l'expression de la fonction réciproque de f_2 .

2. On donne, dans un plan, quatre points O, A, B, C tels que O, A, B ne soient pas alignés et que

$$\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} - 2\overrightarrow{OB};$$

α et λ étant deux nombres réels, on définit successivement les points G_1 , G_2 et G par les conditions suivantes :

$$\begin{aligned}\alpha\overrightarrow{G_1C} + (1-\alpha)\overrightarrow{G_1B} &= \overrightarrow{0}, \\ \alpha\overrightarrow{G_2O} + (1-\alpha)\overrightarrow{G_2C} &= \overrightarrow{0}, \\ \lambda\overrightarrow{GG_1} + (1-\lambda)\overrightarrow{GG_2} &= \overrightarrow{0}.\end{aligned}$$

Exprimer les vecteurs $\overrightarrow{OG_1}$ et $\overrightarrow{OG_2}$ en fonction de \overrightarrow{OA} , \overrightarrow{OB} et du nombre α ; les points G_1 et G_2 peuvent-ils être confondus?

Exprimer le vecteur \overrightarrow{OG} en fonction de \overrightarrow{OA} , \overrightarrow{OB} et des nombres α et λ .

On prend un repère cartésien d'origine O, les vecteurs de base étant \overrightarrow{OA} , \overrightarrow{OB} . Quelles sont les coordonnées du point G?

Quel est le lieu du point G quand, α restant fixe et égal à α_1 , λ varie?

Quel est le lieu du point G quand, λ restant fixe et égal à λ_1 , α varie?

3. Les notations des parties précédentes étant conservées, on se donne le point du plan qui a pour coordonnées x_0 et y_0 et l'on se propose de déterminer α et λ pour que le point G soit confondu avec ce point donné.

Ramener ce problème à la résolution d'une équation du second degré en α et montrer que le problème n'a de solution que si

$$(3x_0 + 2y_0 - 1)^2 - 6x_0 + 3 \geq 0.$$

4. En utilisant les résultats de la première question, déterminer l'ensemble des points du plan pour lesquels le problème précédent a deux solutions; montrer que sur toute droite G_1G_2 il y a un point G_3 , et un seul, pour lequel le problème précédent a une seule solution; calculer les coordonnées de G_3 en fonction de α et montrer que la droite G_1G_2 est tangente en G_3 à son lieu.