

Correction de l'exercice 1

- F est une primitive de la fonction f sur \mathbb{R} si pour tout x réel $F'(x) = f(x)$.
Il suffit donc de calculer la dérivée de la fonction F , soit $F(x) = e^{u(x)}$ donc $f'(x) = u'(x) \times e^{u(x)}$
donc $f'(x) = -2x \times e^{-x^2}$ donc la bonne réponse est la réponse B.
- $h(x) = 0 \iff (7x - 23)e^x = 0$, or $e^x > 0$ donc $h(x) = 0 \iff 7x - 23 = 0 \iff 7x = 23 \iff x = \frac{23}{7}$
donc l'équation a une solution sur $[0; +\infty[$ donc la bonne réponse est la réponse B.
- On sait qu'une primitive de la fonction définie par $f_k(x) = ke^{kx}$ est la fonction définie par $F_k(x) = e^{kx}$.
 $I = [e^{3x}]_0^1 = e^{3 \times 1} - e^0$ donc $I = e^3 - 1$.
La bonne réponse est la réponse A.
- On peut pour cette question utiliser la calculatrice et tracer la courbe de la fonction g .
On peut aussi calculer la dérivée seconde de la fonction g soit g'' .
 $g'(x) = 3x^2 - 9$ et $g''(x) = 6x$ donc on peut dresser le tableau de variation de la fonction g'


x	$-\infty$	0	$+\infty$
g''		$-$	$+$
g'		↘	↗

On en déduit que :

- la fonction g' est croissante sur $[0; +\infty[$ donc la fonction g est convexe sur $[0; +\infty[$;
 - la fonction g' est décroissante sur $] -\infty; 0]$ donc la fonction g est concave sur $] -\infty; 0]$.
- La bonne réponse est la réponse B.

Correction de l'exercice 2

- L'arbre est le suivant :



- $P(L \cap C) = P(L) \times P_L(C) = 0,55 \times 0,95$ donc $P(L \cap C) = 0,5225$.
- $P(C) = P(L \cap C) + P(\bar{L} \cap C) = 0,5225 + P(\bar{L}) \times P_{\bar{L}}(C) = 0,5225 + 0,45 \times 0,1$
donc $P(C) = 0,5675$.
- $P_C(L) = \frac{P(C \cap L)}{P(C)} = \frac{0,5225}{0,5675}$ donc $P_C(L) \approx 0,9207$.
- (a) On sait que $P(C) = 0,5675$ et on choisit 4 élèves au hasard donc X suit la loi binomiale de paramètres $n = 4$ et $p = 0,5675$.
(b) Pour k entier naturel tel que $0 \leq k \leq 4$, on sait que $n = 4$, $p = 0,5675$ et $1 - p = 0,4325$ donc :
 $p(X = k) = \binom{4}{k} \times 0,5675^k \times 0,4325^{4-k}$.
 $p(X = 0) \approx 0,0350$.
- (c) $p(X = 2) \approx 0,3615$.

Correction de l'exercice 3

1. On note $C_0 = 3000$ donc $C_1 = \left(1 + \frac{2,5}{100}\right) \times C_0 = 1,025 \times 3000$ donc $C_1 = 3075$.

De même $C_2 = \left(1 + \frac{2,5}{100}\right) \times C_1 = 1,025 \times 3075$ donc $C_2 = 3151,88$.

2. $C_{n+1} = \left(1 + \frac{2,5}{100}\right) \times C_n$ donc $C_{n+1} = 1,025 \times C_n$.

(C_n) est donc une suite géométrique de raison 1,025 et de premier terme $C_0 = 3000$.

Pour tout entier naturel n donc $C_n = 1,025^n \times C_0$ soit $3000 \times 1,025^n$.

3. (a)	Valeur de n	0	1	2	3	4
	Valeur de U	3000	3075	3152	3231	3311
	Condition $U \leq S$	vrai	vrai	vrai	vrai	faux

(b) Le nombre affiché est donc $2000 + n = 2004$ donc l'affichage obtenu est 2004.

(c) Le nombre obtenu est l'année où le capital obtenu dépassera la somme S .

4. Au 1^{er} janvier 2013, le capital est $C_{13} = 1,025^{13} \times 3000$ donc $C_{13} \approx 4135,53$ qui est donc plus petit que 5000.

On note que $C_{93} \approx 29815,41$ et $C_{94} \approx 30560,79$ donc le 1^{er} janvier 2094 son capital de 3000 a été multiplié par 10.

Correction de l'exercice 4**PARTIE A**

1. Notons que la dérivée de la fonction $x \mapsto e^{-x}$ est la fonction $x \mapsto -e^{-x}$.

$f'(x) = 0 - (1 \times e^{-x} + (x+1)(-e^{-x})) = -e^{-x} + xe^{-x} + e^{-x}$ donc $f'(x) = xe^{-x}$.

2. $e^{-x} > 0$ donc le signe de $f'(x)$ est celui de x . On peut dresser le tableau de variation de la fonction f .

x	0	6
f'		+
f	0	\nearrow $\approx 0,98$

La fonction f est continue et strictement croissante sur $[0; 6]$ avec

x	0	α	6
f	0	\nearrow 0,5	\nearrow $\approx 0,98$

donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires l'équation $f(x) = 0,5$ admet une unique solution α sur $[0; 6]$. De $f(1,678) \approx 0,4999$ et $f(1,679) \approx 0,5002$ on en déduit qu'à 10^{-2} près

$\alpha \approx 1,68$.

3. $I = [F(x)]_0^6 = F(6) - F(0) = 6 + 8e^{-6} - 2$ donc $I = 4 + 8e^{-6} \approx 4,020$.

PARTIE B

1. On cherche donc x tel que $f(x) = 0,5$, en utilisant la question A. 2. on sait que la solution est $\alpha \approx 1,68$ donc au bout de 1,68 mois, soit $1,68 \times 30 \approx 50$ jours, la production atteindra 500 unités.

2. La valeur moyenne de la production, exprimée en milliers, est donnée par $\frac{1}{6-0} \times \int_0^6 f(x) dx = \frac{I}{6} \approx 0,670$ soit 670 unités.

PARTIE C

1. $p(X \leq 160) = 0,5 - p(160 \leq X \leq 200)$ donc $p(X \leq 160) \approx 0,16$.

2. $p(X \geq 320) = 0,5 - p(200 \leq X \leq 320)$ donc $p(X \geq 320) \approx 0,0013$.

Non la probabilité n'est pas supérieur à 0,01.